



**ग्रामाभ्युदयादेव देशाभ्युदयः**  
**गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय**  
**कृषि मौसम विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय**  
**पन्तनगर-263145 उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)**  
**फोन नम्बर: 05944-233032**



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बुलेटिन, जनपद – नैनीताल**

उपमहानिदेशक (कृषि मौसम विज्ञान), भारत मौसम विज्ञान विभाग, पुणे

निदेशक, मौसम केन्द्र, देहरादून

वर्ष: 26 अंक: 75 बुलेटिन अवधि: 27 सितम्बर-1 अक्टूबर, 2017 दिन: मंगलवार दिनांक: 26 सितम्बर, 2017

**मौसम पूर्वानुमान:**

भारत सरकार के पृथक् विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केन्द्र, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, नई दिल्ली द्वारा पूर्वानुमानित तथा मौसम केन्द्र, देहरादून द्वारा संसोधित पूर्वानुमानित मध्यम अवधि मौसम आँकड़ों के आधार पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग में स्थित कृषि मौसम विज्ञान प्रक्षेत्र इकाई (AMFU), गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में अगले पाँच दिनों में निम्न मौसम रहने की संभावना व्यक्त की जाती है :–

पूर्वानुमानित मौसम तत्व	मौसम पूर्वानुमान – नैनीताल				
	27-09-2017	28-09-2017	29-09-2017	30-09-2017	01-10-2017
वर्षा (मिमी0)	5	3	5	3	0
अधिकतम तापमान (डिग्री से.ग्रे.)	22	22	23	23	24
न्यूनतम तापमान (डिग्री से.ग्रे.)	14	15	15	15	15
बादल आच्छादन	मध्यम बादल	मध्यम बादल	मध्यम बादल	मध्यम बादल	आंशिक बादल
अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता (प्रतिशत)	95	95	90	90	85
न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता (प्रतिशत)	60	60	60	60	55
वायु की औसत गति (कि0मी0 प्रतिघंटा)	006	006	006	008	008
वायु की दिशा	उत्तर-पश्चिम	पूर्व-दक्षिण-पूर्व	पूर्व-दक्षिण-पूर्व	पूर्व-दक्षिण-पूर्व	पूर्व-दक्षिण-पूर्व

भारत मौसम विज्ञान विभाग के नैनीताल स्थित मौसम विज्ञान वेधशाला (समुद्रतल से ऊँचाई-2084 मीटर) के प्रेक्षणानुसार विगत सात दिनों (19 से 25 सितम्बर, 2017 सुबह 8:30 तक) में मध्यम से घने बादल छाये रहे तथा अधिकतम तापमान 17.8 से 22.8 डिसे0 एवं न्यूनतम तापमान 12.6 से 13.6 डिसे0 के बीच रहा। ऐसे अनुमानित मौसम में गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र के कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में विभिन्न फसलों के लिए खेतों में निम्नानुसार कार्यक्रम अपनायें।

**कृषि मौसम परामर्श**

**फसल प्रबन्धः**

- ❖ धान की फसल में जीवाणु झुलसा रोग की रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लीन 15 ग्राम + कॉपर आक्सीक्लोरोइड 500 ग्राम/है0 की दर से छिड़काव करें।
- ❖ किसान भाई खेत तैयार कर तोरिया फसल की प्रजातियों पी0टी0 303, पी0टी0 30, पी0टी0 30, पी0टी0 507, भवानी व वी0एल0 तोरिया 3 की बुवाई करें।
- ❖ तोरिया की बुवाई हेतु बीज दर 5 किग्रा0/है0 तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30से0मी0 रखें।

- ❖ तोरिया की बुवाई सितम्बर के द्वितीय पखवाड़े में करें।
- ❖ बीज उपचार हेतु थायरम 2.5 ग्राम/कि०ग्रा० बीज या मैनकोजेब 3 ग्राम/कि०ग्रा० बीज से उपचारित करें।
- ❖ तोरिया हेतु 90 कि०ग्रा० नत्रजन, 40 कि०ग्रा० फास्फोरस एवं 20 कि०ग्रा० पोटाश की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा बुवाई के समय प्रयोग करें। बुवाई के 20–25 दिन बाद नत्रजन की शेष बची आधी मात्रा का प्रयोग करें।
- ❖ धान की फसल में निचली पत्तियों के सूखने के लक्षण दिखाई पड़ने पर कार्बैडाजिम 50 प्रतिशत डब्लू०पी० का 1 किलो ग्राम /है० की दर से छिड़काव करें।
- ❖ दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण तथा जल निकासी की उचित व्यवस्था करें।
- ❖ गन्ने के तीन झुण्डों को को आपस में मिलाकर बधाई करें।
- ❖ धान फसलों में खरपतवार नियंत्रण तथा पानी रोकने की उचित व्यवस्था करें।
- ❖ धान में तना वेधक व पत्ति मरोड़क का प्रकोप होने पर क्लोरान्ट्रनिलिप्रोल 0.4 जी को 10000 ग्राम/है० या फिप्रोनिल 0.3 जीआर 25000 ग्राम/है० या कारटाप 4 जीआर 18750 ग्राम /है० की दर से छिड़काव रोपाई से 50 दिन के अन्दर करें।

#### **उद्यान प्रबन्ध:**

- ❖ टमाटर की फसल में पत्तियां सिकुड़ने की अवस्था में प्रभावित पौधों को निकालकर नष्ट कर दें एवं किसी सर्वांगी कीटनाशी का छिड़काव करें।
- ❖ मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बैंगन एवं शिमलामिर्च के फलों की तुड़ाई करें तथा रोग युक्त फलों/पत्तियों या पौध अवशेषों को खेत से बाहर करें।
- ❖ सिंचित घाटी क्षेत्रों में आलू की अगेती प्रजाति की बुवाई माह के अंतिम सप्ताह में करें।
- ❖ घरेलू खपत के लिए सिंचित दशाओं में बदगोभी की अगेती प्रजातियों एवं फूलगोभी की स्नोबॉल प्रजातियों का प्रतिरोपण करें।
- ❖ असिंचित मध्यम ऊंचे क्षेत्रों में मूली की प्रजाति जैसे मीनू अर्ली, जपानी वाईट, पूसा हिमानी एवं शलजम की अगेती प्रजाति परपिलटाप, वाईट ग्लो, की तुरंत बुवाई करें।
- ❖ आलू की खड़ी फसल में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें तथा उपर्युक्त नमी की दशा में खुदाई कर कंदो को बजार में बेचें।
- ❖ यदि बन्दगोभी, फूलगोभी, मूली एवं शलजम आदि सब्जियों की यदि पूर्व में बुवाई/प्रतिरोपित की गई हो तथा फसल लगभग तैयार है तो कटाई कर बाजार में बिक्री करें।
- ❖ यदि पॉलिहाउस इस समय खाली हो तो उनकी सफाई कर आने वाले समय में (10–15 दिन के भीतर) शलजम, इनागिरी मूली, फासबीन, मटर की बुवाई करें। सब्जी राई की पहले पौध तैयार करें तदपश्चात् 25–30 दिन के भीतर पौध प्रतिरोपण करें।
- ❖ पर्वतीय क्षेत्रों में असिंचित दशा में मूली एवं राई की बुवाई करें।
- ❖ शीतोष्ण फलों में, तनों तथा टैहनियों पर लाइकेन की पपड़ी को हटाने के लिए 1 प्रतिशत कार्सिक सोडा का छिड़काव करें।
- ❖ सदाबहार फल पौधों जैसे आम, अमरुद, नींबू, पपीता, लीची आदि फल पौधों को लगायें।
- ❖ बागीचों में खरपतवारों के नियंत्रण हेतु निराई–गुड़ाई करें।

#### **पशुपालन प्रबन्ध:**

- ❖ पशुओं के लिए हरे चारे में दलहनी चारा सर्वोत्तम आहार है जो पशुओं के जीवन यापन के साथ–साथ उत्पादन में भी सहायक होता है। अतः पशुपालकों से निवेदन है कि पशुओं को स्वस्थ रखने व अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु सर्वोत्तम दलहनी चारा (बरसीम) अवश्य बोयें क्योंकि 5 कि०ग्रा० बरसीम (हरा चारा), 1 किलो ग्राम सान्द्र आहार के बराबर होता है।
- ❖ इस महीने पशुओं खासकर भैंसों में प्रसव की दर बढ़ जाती है। अतः जो पशु ज्ञामन है उनको अन्य पशुओं से अलग कर थोड़ी मात्रा में कई बार अतिरिक्त पूरक आहार दें अन्यथा उन्हें आफरा (पेट फूलना) की समस्या हो सकती है।
- ❖ प्रसव के 2 घंटे के भीतर नवजात की अच्छे से सफाई करने के उपरान्त उसको निश्चित रूप से थोड़ी मात्रा (1/2 – 1 कि०ग्रा०) खीस पिला दें।
- ❖ पशुओं को हरा चारा कम मात्रा में दें तथा हरे चारे में सूखा चारा मिलाकर दें।

- ❖ पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए तथा गन्दे पानी में परजीवी जनित व फफूदी जनित विषाणु की सम्भावना होती है।
- ❖ पशुओं का आवास सूखा होना चाहिए इसके लिए समय—समय पर चूने का छिड़काव करें।

डा० आर० के० सिंह

प्राध्यापक एवं प्रिंसिपल नोडल अधिकारी

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा,

गो.ब. पन्त कृषि एवं प्रौद्यो. विष्वविद्यालय, पन्तनगर