



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 14-11-2024

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-14 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-15	2024-11-16	2024-11-17	2024-11-18	2024-11-19
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	17.0	17.0	17.0	17.0	16.0
न्यूनतम तापमान(से.)	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	62	62	60	60	60
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	52	50	50	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	6	8	7
पवन दिशा (डिग्री)	320	330	320	320	330
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी सप्ताह में 14 से 18 नवंबर तक बारिश नहीं होने तथा अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 16.0-17.0 डिग्री सेल्सियस तथा 5.0-6.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवाएं उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम-उत्तर दिशा से 5-8 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। 14 से 18 नवंबर तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

### सामान्य सलाहकार:

छेत्र में मौसम की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट के लिए, किसान "मेघदूत" ऐप से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) पर उपलब्ध दामिनी" ऐप से बिज ली की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। एनडीवीआई राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में 0.25-0.45 के बीच अच्छी कृषि शक्ति दर्शाता है। 15.10.2024 से 21.10.2024 के दौरान भारी कमी वाली वर्षा और सामान्य अधिकतम-न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी सप्ताह में मौसम शुष्क रहेगा, इसलिए कृषि कार्यों की योजना तदनुसार बनाई जा सकती है।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चना	फसल की नियमित निगरानी करनी चाहिए तथा 25-30 दिन के अंतराल पर फसल की निराई-गुड़ाई करते रहना चाहिए।
मसूर की दाल	फसल की नियमित निगरानी करनी चाहिए तथा 25-30 दिन के अंतराल पर फसल की निराई-गुड़ाई करते रहना चाहिए।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
अरहर (लाल चना/अरहर)	पकी हुई फसल की कटाई कर लेनी चाहिए और अच्छी तरह सुखाकर तथा मड़ाई करके भली-भांति भण्डारित कर लेना चाहिए।
गुर्दे की फलियाँ / राजमा	पकी हुई फसल की कटाई कर लेनी चाहिए और अच्छी तरह सुखाकर तथा मड़ाई करके भली-भांति भण्डारित कर लेना चाहिए।
रेपसीड	एक महीने पुरानी फसल की निगरानी करनी चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए।
सरसों	एक महीने पुरानी फसल की निगरानी करनी चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए।
गेहूँ	घाटियों और निचली पहाड़ियों में बुआई महीने के दूसरे पखवाड़े में की जा सकती है।

#### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	नर्सरी में स्थानीय किस्मों की बुआई एवं अंकुरण के बाद नियमित निगरानी करनी चाहिए।
मूली	बीज उत्पादन के लिए नए खेत में मूली, शलजम एवं गाजर की चयनित जड़ की रोपाई करनी चाहिए।

#### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	बदलते मौसम के साथ पशुओं के नवजात शिशुओं में निओमोनिया की संभावना अधिक रहती है इसलिए सलाह दी जाती है कि पशु को ठंड से बचाना चाहिए और पशुओं को गर्म भोजन देना चाहिए।
गाय	मानसून के बाद आहार नाल में विभिन्न प्रकार के आंतरिक परजीवी उत्पन्न हो सकते हैं इसलिए सबसे पहले पशुओं को कृमिनाशक दवा देनी चाहिए।