



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 29-08-2023

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-08-29 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-08-30	2023-08-31	2023-09-01	2023-09-02	2023-09-03
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	35.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	23.0	24.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	6	6	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	70	70	70	70	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	1	1	1	1

### मौसम सारांश / चेतावनी:

पिछले सात दिनों (22-28 अगस्त) में 102.6 मिमी बारिश दर्ज की गई और अधिकतम और न्यूनतम तापमान 27.0 से 33.5 डिग्री सेल्सियस और 24.1 से 26.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले सप्ताह के दौरान अधिकांश दिनों में आसमान साफ रहने के साथ साथ कभी कभी बादलों से घिरा रहा। सुबह की सापेक्ष आर्द्रता 0712 बजे 87 से 95% और शाम की सापेक्षिक आर्द्रता 1412 बजे 62 से 92% के बीच रही। हवा की गति 0.2 से 6.0 किमी प्रति घंटा रही और दिशा अधिकतर उत्तर की ओर थी। आगामी पांच दिनों के पूर्वानुमान में बूँदा-बाँदी (0-1 mm) होने के असर हैं और अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और 23-24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्शाया गया है। हवा की गति 6-8 किमी प्रति घंटा होगी और दिशा ज्यादातर उत्तर-उत्तर-पूर्व होगी। जिले में शुष्क मौसम बने रहने का अनुमान है।

### सामान्य सलाहकार:

17-23 अगस्त, 2023 के लिए प्राप्त साप्ताहिक वर्षा 86.9 मिमी है जो सामान्य वर्षा (76.1 मिमी) के मुकाबले 12% कम है और सामान्य वर्षा पैटर्न दर्शाता है, जबकि विस्तारित सीमा पूर्वानुमान प्रणाली सप्ताह (25-31 अगस्त) के लिए सामान्य वर्षा पैटर्न से कम दिखाती है। क्षेत्र के लिए एनडीवीआई समग्रता 0.3-0.4 के बीच है जो क्षेत्र में मध्यम कृषि शक्ति का संकेत देती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान आदि की जानकारी के लिए "मेघदूत ऐप" डाउनलोड करें बिजली संबंधी जानकारी पाने के लिए कृषि मौसम संबंधी सलाह और "दामिनी ऐप"। मेघदूत और दामिनी ऐप्स कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किया जा सकता है। इससे उन्हें कृषि गतिविधियों के संबंध में सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी सप्ताह में हल्की बूदाबांदी हो सकती है, जिससे किसान उपयोग के अनुसार खेती की सभी गतिविधियाँ आसानी से कर सकेंगे।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	फसल में अब बालियां बनना शुरू हो जाएंगी तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग के साथ-साथ खेत में उचित सिंचाई और जल निकासी का रखरखाव करना होगा। बैक्टीरियल ब्लाइट के लक्षण जैसे पत्तियों पर पानी से लथपथ धब्बे और उनके धीरे-धीरे बढ़ने पर लंबी धारियां बन जाती हैं जो धीरे-धीरे हल्के भूरे रंग की हो जाती हैं। इस रोग को खेत में फैलने से रोकने के लिए खेत में जल जमाव की स्थिति न रखें और इसके साथ ही नाइट्रोजन का प्रयोग फिलहाल बंद कर देना चाहिए। अधिक रोग होने पर स्टेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम + कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव 7-10 दिनों के अंतराल पे करना चाहिए। तना छेदक कीट यदि ईटीएल के ऊपर उपस्थिति है तो उस पर क्लोरान्टानिलीप्रोले 20 एस.सी 150 मि.ली. या फ्लूबेंडियामाइड 480 एससी 75 मि.ली. या फिप्रोनिल 5 एससी 1.0 लीटर या 600 ग्राम कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 डब्लूपी या 2.5 लीटर क्लोरपाइरीफॉस 20 ईसी प्रति हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। आम कीट यानी धान फुदका के प्रकोप पर किसानों को ट्राइप्लूमेज़ोपायरिम 10 एससी 235 मिली/फिप्रोनिल 5 एससी 1000 मिली/बुप्रोफेज़िन 25 एससी 1 लीटर/ थियामेथोकजाम 25 डब्लूएसजी 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव तने के पास करना चाहिए। कम संक्रमण की स्थिति में बुप्रोफेज़िन, अधिक संक्रमण की स्थिति में ट्राइप्लूमेज़ोपायरिम और तना छेदक+ब्राउन प्लांट हॉपर के हमले की स्थिति में फिप्रोनिल 5 एससी का उपयोग करना चाहिए।
गन्ना	सबसे प्रचलित लाल सड़न रोग के लक्षण मानसून के मौसम के बाद प्रकट हो सकते हैं जो कटाई तक बने रहते हैं। इसके लिए किसानों को प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना होगा और अपने खेतों को साफ रखना होगा। संक्रमित गन्नों को जड़ से उखाड़कर जला देना चाहिए। संक्रमित गन्नों को पूरी तरह नष्ट करना और उपचारित बीजों का उपयोग सर्वोत्तम निवारक उपाय हैं। आवश्यकतानुसार दो पंक्तियों के तीन डंठलों को एक साथ बांधना चाहिए (कैंची बांधनी चाहिए)। सफेद ग्रब का प्रकोप होने पर फिप्रोनिल 40 प्रतिशत और इमिडाक्लोप्रिड 40 प्रतिशत डब्लूजी 200 ग्राम प्रति एकड़ को 500 लीटर पानी में घोलकर खेत में डालना चाहिए।
मक्का	जैसे ही भुट्टों में बीज भरने लगें, आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए। कीट का प्रकोप होने पर उचित कृषि उपाय करना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में फॉल आर्मी वर्म के हमले की स्थिति में, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 एससी 0.4 मि.ली./लीटर पानी की दर से उपयोग करना चाहिए। मैकोजेब या जिनेब 75 WP 1.5 -2.0 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 750- 800 लीटर पानी में ब्लाइट (पीले या भूरे रंग का अंडा जहाज आकार के धब्बे) लगने पर छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 10-15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए।
मूँग	अंतिम माह में बोई गई फसल में निराई-गुड़ाई करनी चाहिए तथा फसल की आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करनी चाहिए।
काला चना	अंतिम माह में बोई गई फसल में निराई-गुड़ाई करनी चाहिए तथा फसल की आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करनी चाहिए।
सोयाबीन	यदि वर्षा पर्याप्त न हो तो फूल एवं फलियाँ बनने पर आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करनी चाहिए।
मूँगफली	टिक्का रोग में पत्तियों पर हलके भूरे रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं जिसके चारों ओर निचली सतह पर पीले घेरे होते हैं। इसके उपचार हेतु खड़ी फसल पर क्लोरोथेनोनिल 2 कि.ग्रा./ मैकोजेब 80% 2 कि.ग्रा./ प्रोपिकोनाज़ोले 25 ई.सी. 500 मि. ली. मात्रा 800 से 1000 ली. पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2-3 छिड़काव 10-12 दिन के अंतराल पे करें। सभी कृषि गतिविधियाँ साफ़ मौसम की स्थिति में की जानी चाहिए।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	फूलगोभी की पछेती किस्मों, पत्तागोभी की किस्मों और नोल-खोल की रोपाई इस महीने में की जा सकती है और यह तब किया जाना चाहिए जब अंकुर 4-6 सप्ताह के हो जाएं या वे 4-6 पत्ती अवस्था प्राप्त कर

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	लें।
मूली	इस महीने में मूली की यूरोपीय किस्में, एशियाई और यूरोपीय किस्मों की गाजर और चुकंदर की बुआई की जा सकती है।
मिर्च	मिर्च की फसल का ऊपरी तना सूखने पर तथा काला पड़ जाने पर फसल को बचाने के लिए संक्रमित शाखाएं तोड़ कर हटा देना चाहिए। फसल को सड़ने से बचने के लिए 0.1% कैबेन्डाजिम घोल का छिड़काव करें।
पपीता	पपीते में कॉलर रॉट रोग लगने पर मेटलैक्जिल + मैन्कोजेब (रिडोमिल गोल्ड ) का 2 ग्राम/लीटर पानी की दर से प्रयोग बहुत प्रभावी पाया गया है। छिड़काव 10 दिनों के अंतराल पर दोहराया जा सकता है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	मादा बछियो का माँ से दूध छः महीने के बाद ही छुड़वाना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो सके।
भैंस	'फूटरॉट' रोग को रोकने के लिए, खुरों को कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम के समय 2-3 मिनट के लिए 10% फॉर्मेलिन घोल या 5% नीले थोथे में डुबोया जाना चाहिए।