



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 29-11-2024

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-11-29 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-11-30	2024-12-01	2024-12-02	2024-12-03	2024-12-04
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0
न्यूनतम तापमान(से.)	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	72	70	70	68	65
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	42	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	4	5	6	5
पवन दिशा (डिग्री)	360	330	320	320	320
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले पांच दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 15.0-16.0 डिग्री सेल्सियस और 4.0-5.0 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम-उत्तर दिशा से 4-6 किमी/घंटा की गति से हवा चलने की उम्मीद है। आने वाले सप्ताह में शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

छेत्र में मौसम की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट के लिए, किसान "मेघदूत" ऐप से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) पर उपलब्ध दामिनी" ऐप सेबिज ली की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। एनडीवीआई राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में 0.20-0.45 के बीच अच्छी कृषि शक्ति दर्शाता है। 29.11.2024 से 05.12.2024 के दौरान भारी कमी वाली वर्षा और सामान्य अधिकतम-न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, शुष्क मौसम की उम्मीद है, इसलिए रबी फसल की बुवाई कर लेनी चाहिए और सूखी उपज का भण्डारण अच्छी तरह से करना चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चना	फसल की नियमित निगरानी करनी चाहिए तथा 25-30 दिन के अंतराल पर फसल की निराई-गुड़ाई करनी चाहिए।
मसूर की दाल	फसल की नियमित निगरानी करनी चाहिए तथा 25-30 दिन के अंतराल पर फसल की निराई-गुड़ाई करनी चाहिए।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
अरहर (लाल चना/ अरहर)	पकी हुई फसल को काटा जाना चाहिए और उचित सुखाने और थ्रेसिंग के बाद अच्छी तरह से संग्रहीत किया जाना चाहिए।
गुर्दे की फलियाँ / राजमा	पकी हुई फसल को काटा जाना चाहिए और उचित सुखाने और थ्रेसिंग के बाद अच्छी तरह से संग्रहीत किया जाना चाहिए।
सरसों	एक महीने पुरानी फसल की निगरानी करनी चाहिए तथा हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए।
रेपसीड	एक महीने पुरानी फसल की निगरानी करनी चाहिए तथा हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए।
गेहूँ	घाटियों और निचली पहाड़ियों में बुवाई महीने के दूसरे पखवाड़े में की जा सकती है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सब्जी पीईए	बुवाई कर देनी चाहिए और पहले से उग रही फसल पर कीट और रोग के हमले की निगरानी करनी चाहिए। परिपक्व फलियों को तोड़कर बाजार में उपलब्ध करा देना चाहिए।
मूली	बीज उत्पादन हेतु मूली, शलजम एवं गाजर की चयनित जड़ की रोपाई नये खेत में करनी चाहिए।
प्याज	नर्सरी तैयार की जानी चाहिए और पौधों को ठंड से बचाया जाना चाहिए। नर्सरी फसल की बीमारियों के लिए नियमित निगरानी की जानी चाहिए और उचित सिफारिशों का पालन किया जाना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	बदलते मौसम के साथ पशुओं के नवजात शिशुओं में निओमोनिया की संभावना अधिक रहती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि पशु शेड को ठंड से बचाना चाहिए और पशुओं को गर्म भोजन देना चाहिए।
गाय	मानसून के बाद आहार नाल में विभिन्न प्रकार के आंतरिक परजीवी उत्पन्न हो सकते हैं इसलिए सबसे पहले पशुओं को दवा यानि कृमिनाशक दवा देनी चाहिए।