



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 18-10-2024

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-10-18 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-10-19	2024-10-20	2024-10-21	2024-10-22	2024-10-23
वर्षा (मिमी)	0.0	0.6	0.0	0.9	0.8
अधिकतम तापमान(से.)	23.0	23.0	23.0	22.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	12.0	12.0	12.0	11.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	75	70	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	35	30	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	3	2	2	3
पवन दिशा (डिग्री)	120	140	120	140	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	3	2	4	3

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले पांच दिनों में 19, 21 और 22 अक्टूबर को 0.6-0.9 मिमी की हल्की बूंदाबांदी की भविष्यवाणी की गई है और क्षेत्र में अन्य दिनों में शुष्क स्थिति बनी रह सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 22.0-23.0 डिग्री सेल्सियस और 11.0-12.0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। दक्षिण-पूर्व-दक्षिण और दक्षिण-पूर्व-पूर्व दिशा से 2-8 किमी/घंटा की गति से हवा चलने की उम्मीद है। 18 से 22 अक्टूबर, 2024 तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

### सामान्य सलाहकार:

छेत्र में मौसम की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट के लिए, किसान "मेघदूत" ऐप से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) पर उपलब्ध दामिनी" ऐप सेबिज ली की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। एनडीवीआई राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में 0.25-0.45 के बीच अच्छी कृषि शक्ति दर्शाता है। 18.10.2024 से 24.10.2024 के दौरान भारी कमी वाली वर्षा और सामान्य अधिकतम-न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार शुष्क मौसम की उम्मीद है, इसलिए परिपक्व उपज की कटाई की जानी चाहिए, सूखाया जाना चाहिए और अच्छी तरह से संग्रहीत किया जाना चाहिए।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पकी हुई फसल की कटाई कर लेनी चाहिए और अनाज को खराब होने से बचाने के लिए उचित भंडारण करना चाहिए।
रागी	पकी हुई फसल की कटाई कर लेनी चाहिए और अनाज को खराब होने से बचाने के लिए उचित भंडारण करना चाहिए।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सोयाबीन	पकी हुई दलहनी फसल को काटकर सूखने के लिए रख देना चाहिए। फसल सूखने के 2-3 दिन बाद उसकी मड़ाई कर अच्छे से भण्डारण कर लेना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	पकी हुई दलहनी फसल को काटकर सूखने के लिए रख देना चाहिए। फसल सूखने के 2-3 दिन बाद उसकी मड़ाई कर अच्छे से भण्डारण कर लेना चाहिए।
रेपसीड	तोरिया की बुआई 4-5 सेमी की गहराई पर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेमी पर की जा सकती है।
सरसों	सरसों की बुआई 4-5 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 3-4 सेमी की गहराई पर और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेमी पर की जा सकती है।
गेहूँ	वर्षा आधारित परिस्थितियों में ऊंची पहाड़ियों में बुवाई अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक पूरी हो जानी चाहिए, जबकि मध्य और निचली पहाड़ियों में बुवाई अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में हो जानी चाहिए।
जौ	फसल की बुवाई असिंचित दशा में ऊँचे छेत्रों में माह के प्रथम पक्ष में तथा कम व मध्यम ऊँचाई वाले छेत्र में माह के द्वितीय पक्ष में।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	पर्वतीय छेत्र की सिंचित घाटी में आलू की बुवाई की जा सकती है।
सेब	संक्रामित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें तथा गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।
आड़ू	संक्रामित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें तथा गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।
नाशपाती	संक्रामित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें तथा गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।
बेर	संक्रामित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें तथा गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गाय / भैंसों को प्रजनन से पूर्व विब्रियोसिस-एल-5, आई.वी.आर., बी.वि.डी., पैराइनफ्लुएन्जा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग लगवाए।
गाय	गाय / भैंसों को प्रजनन से पूर्व विब्रियोसिस-एल-5, आई.वी.आर., बी.वि.डी., पैराइनफ्लुएन्जा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग लगवाए।