



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-10-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-10-07 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-10-08	2025-10-09	2025-10-10	2025-10-11	2025-10-12
वर्षा (मिमी)	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	25.0	26.0	26.0	27.0
न्यूनतम तापमान(से.)	15.0	16.0	16.0	15.0	15.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	89	86	84	81	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	54	45	42	46	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	7	7	7	6
पवन दिशा (डिग्री)	320	140	130	170	180
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	0	0	1	0
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में 7 अक्टूबर को हल्की बारिश के साथ मौसम में उतार-चढ़ाव की संभावना है, अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 24-27 डिग्री सेल्सियस और 15-16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवाएँ उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व-पूर्व और दक्षिण दिशा से 6-9 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। 7 अक्टूबर को, इस क्षेत्र में गरज/बिजली, तूफान और तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है, जबकि सप्ताह के अन्य दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

7 अक्टूबर के दौरान होने वाली वर्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी नहीं है, लेकिन खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

आगामी दिनों में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव अपेक्षित नहीं है, तथापि 7 अक्टूबर के लिए उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 10.10.2025 से 16.10.2025 के दौरान भारी कम वर्षा, सामान्य अधिकतम और न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए निर्धारित कृषि गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	चावल के सामान्य कीट, यानी ब्राउन प्लांट हॉपर के संक्रमण को रोकने के लिए, किसानों को ट्राइफ्लुमेज़ोपाइरिम 10 एससी 235 मिली/ फिप्रोनिल 5 एससी 1000 मिली/ बुप्रोफेज़िन 25 एससी 1 लीटर/ थियामेथोक्सम 25 डब्ल्यूएसजी 100 ग्राम को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव तने के पास करना चाहिए। कम संक्रमण होने पर बुप्रोफेज़िन, ज़्यादा संक्रमण होने पर ट्राइफ्लुमेज़ोपाइरिम और तना छेदक+ब्राउन प्लांट हॉपर के हमले पर फिप्रोनिल 5 एससी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा, अचानक बारिश से गिरे चावल की फसल के दानों को खराब होने से बचाने के लिए फसल को सीधा बाँध देना चाहिए।
रागी	मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में परिपक्व बाजरे की किस्मों की कटाई करके उन्हें 2-3 दिनों तक सूखने के लिए रख देना चाहिए। खराब मौसम की स्थिति में, कटी हुई उपज को छप्पर के नीचे रखना चाहिए।
मक्का	परिपक्व भुट्टों में उचित कृषि उपायों द्वारा पक्षियों के हमलों से बचें। ऊँची पहाड़ियों पर परिपक्व भुट्टों की तुड़ाई तब करनी चाहिए जब वे पीले पत्तों से ढके हों। कटे हुए भुट्टों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें छप्पर के नीचे सुखाना चाहिए।
सोयाबीन	पक रही दलहनी फसल को तोड़कर सुखा लेना चाहिए। पक चुकी दलहनी फसल में पीलापन, सूखना और अंततः पत्तियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद फलियों को काटकर 2-3 दिन तक सुखा लेना चाहिए।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में फली बनने पर, अच्छी फली उपज के लिए खेत में उचित नमी बनाए रखें, जबकि घाटियों और निचली पहाड़ियों में परिपक्व फसल को काटकर 2-3 दिनों के लिए सुखा देना चाहिए।
रेपसीड	घाटियों में चावल की कटाई के बाद और मध्यम व ऊँची पहाड़ियों में दालों और बाजरे की कटाई के बाद तोरिया और पीली सरसों की फसल बोनी चाहिए। बुवाई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी और मेड़ों से 30 सेमी पर करनी चाहिए। बुवाई से पहले बीजों को मेटालैक्सिल 35 डब्ल्यू.एस. 4 ग्राम/किग्रा बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	अगेती किस्मों की तुड़ाई करके उन्हें बाज़ार में खपत के लिए भेज देना चाहिए। मध्यम किस्मों में यूरिया की टॉप-ड्रेसिंग करनी चाहिए और निराई, गुड़ाई और सिंचाई जैसी नियमित प्रक्रियाओं पर नज़र रखनी चाहिए। जलभराव की स्थिति में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें।
मूली	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए तथा फसल की नियमित निराई-गुड़ाई करनी चाहिए।
गाजर	खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखनी चाहिए तथा फसल की नियमित निराई-गुड़ाई करनी चाहिए।
बाकला	इस महीने में बुवाई शुरू की जा सकती है। सभी कृषि कार्य मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। फसल को 2-3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो आवश्यकतानुसार दी जानी चाहिए।
नींबू	यदि साइटस येलो मोज़ेक वायरस के लक्षण दिखाई दें, तो संक्रमित टहनियों की छंटाई करें और इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस एल 1 मिली/3 लीटर पानी या थायमेथोक्सम 25% डब्ल्यूजी 1 ग्राम/3 लीटर पानी जैसे प्रणालीगत कीटनाशक का छिड़काव करें। थायमेथोक्सम का पहला छिड़काव कीट के शुरुआती

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	लक्षण दिखने पर करें और कीट की तीव्रता के आधार पर 15-21 दिनों के अंतराल पर 2-3 छिड़काव दोहराएँ।
सेब	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।
आड़ू	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।
नाशपाती	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।
बेर	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें, जबकि गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	प्रजनन से पहले गायों/भैंसों को वाइब्रियोसिस-एल-5, आईवीआर, बीवीडी, पैराइन्फ्लुएंजा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग दिए जाने चाहिए।
भैंस	प्रजनन से पहले गायों/भैंसों को वाइब्रियोसिस-एल-5, आईवीआर, बीवीडी, पैराइन्फ्लुएंजा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग दिए जाने चाहिए।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	पशु चिकित्सक की सिफारिश पर पोल्ट्री पक्षियों को कृमिनाशक खुराक दी जानी चाहिए क्योंकि पोल्ट्री पक्षियों में कृमि अंडे की उत्पादन क्षमता को कम कर देते हैं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई सलाह नहीं।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details