



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-03-2026

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-03-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-03-31	2026-04-01	2026-04-02	2026-04-03	2026-04-04
वर्षा (मिमी)	3.0	0.2	0.4	0.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	26.4	26.8	27.0	27.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	15.0	16.0	16.0	17.5	17.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	67	56	52	48	50
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	28	19	19	16	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	6	10	11	10
पवन दिशा (डिग्री)	32	300	310	270	30
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	3	4	3	5
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में 1-4 मिमी तक हल्की बूदाबांदी हो सकती है और 30 मार्च के लिए गरज, बिजली, आंधी और तेज हवाओं के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.4 से 28.0 डिग्री सेल्सियस और 15.0 से 17.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा उत्तर-पूर्व-उत्तर, उत्तर-पश्चिम-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम दिशा से 7-11 किमी प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है। 30 मार्च के लिए कुछ स्थानों पर गरज, बिजली, आंधी आदि और तेज हवाओं के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है, जबकि आगामी सप्ताह के अन्य दिनों में हल्की बूदाबांदी होने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

30 मार्च को कुछ स्थानों पर गरज, बिजली, तेज हवाओं और तूफान के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है और सभी दिनों में हल्की बूदाबांदी होने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

सिंचाई करने से बचें और रसायनिक पदार्थों का प्रयोग उन दिनों के लिए निर्धारित करें जब कोई चेतावनी जारी न की गई हो।

सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि-सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 27 मार्च से 2 अप्रैल तक के विस्तारित पूर्वानुमान में सामान्य से अधिक वर्षा और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का संकेत दिया गया है।

लघु संदेश सलाहकार:

हल्की बूँदाबाँदी और गरज के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए, सिंचाई और रसायनिक पदार्थों का प्रयोग केवल 30 मार्च को जारी की गई पीली चेतावनी के दिनों के अलावा अन्य दिनों में ही करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मसूर की दाल	सिंचाई और कीटनाशक या रोग नियंत्रण रसायन जैसे कि इंडोक्साकार्ब, इमेमेक्टिन बेंजोएट और क्लोरेंट्रानिलिप्रोले की अनुशंसित खुराक को उन दिनों में निर्धारित और लागू किया जाना चाहिए जब कोई चेतावनी जारी नहीं की गई हो।
सरसों	परिपक्व फसल को कटाई के बाद अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए और फिर थ्रेसिंग करनी चाहिए। फली विकास के चरण में उचित सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। कटाई के बाद फलियों को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारित करना चाहिए। फसल को खराब होने से बचाने के लिए उसे छाया में रखें।
गेहूँ	खरपतवारनाशकों और किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करके खरपतवारों को नियंत्रित करें, सिंचाई तथा रसायनिक पदार्थ का प्रयोग उन दिनों में की जानी चाहिए जब कोई पीली चेतावनी जारी न की गई हो।
चावल	पहाड़ी क्षेत्रों में चेतकी धान की बुवाई उन दिनों में की जा सकती है जब कोई पीली चेतावनी जारी न की गई हो।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	पहाड़ी क्षेत्रों में बुवाई करनी चाहिए और नए पौधों की सिंचाई करनी चाहिए।
टमाटर	मध्यपहाड़ी क्षेत्रों में पॉलीहाउस/पॉलीनेट विधि से टमाटर की खेती की जा सकती है।
शिमला मिर्च	मध्यपहाड़ी क्षेत्रों में पॉलीहाउस/पॉलीनेट में शिमला मिर्च तैयार की जा सकती है।
बैंगन	मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में पॉलीहाउस/पॉलीनेट में बैंगन की खेती की जा सकती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	गर्भवती पशुओं में प्रसवोत्तर ज्वर से बचाव के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें प्रतिदिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान वे बांझपन और जॉन रोग (पैराट्यूबरकुलोसिस) के प्रति संवेदनशील होते हैं। वयस्क पशुओं में, फुट एंड माउथ रोग के टीकाकरण से 15 दिन पहले कृमिनाशक दवा का प्रयोग करना आवश्यक है।
गाय	गर्भवती पशुओं में प्रसवोत्तर ज्वर से बचाव के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें प्रतिदिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान वे बांझपन और जॉन रोग (पैराट्यूबरकुलोसिस) के प्रति संवेदनशील होते हैं। वयस्क पशुओं में, फुट एंड माउथ रोग के टीकाकरण से 15 दिन पहले कृमिनाशक दवा का प्रयोग करना आवश्यक है।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

30 मार्च को गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं के कारण फसल की पैदावार में कमी, फसल के गिरने और नियमित कृषि गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

सिंचाई और अन्य रसायनिक पदार्थों के प्रयोग को 30 मार्च के अलावा अन्य दिनों में निर्धारित किया जाना चाहिए, जब तेज हवाएं चलने की कोई संभावना ना हो।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details