



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-08-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-07 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-08	2026-08-09	2026-08-10	2026-08-11	2026-08-12
वर्षा (मिमी)	5.0	6.0	10.0	15.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	35.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	90	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	60	65	62	61
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	5	10
पवन दिशा (डिग्री)	140	150	130	120	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	7	5	4
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि

पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (31 जुलाई-6 अगस्त) के दौरान 24.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 29.6 से 32.5 डिग्री सेल्सियस और 24.5 से 27.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 82-93% और 69-89% के बीच रही। हवा पूर्व-दक्षिण-पूर्व, पूर्व और पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा से 5.7-9.1 किमी प्रति घंटे की गति से चली। पिछले सप्ताह अधिकांश दिनों में मौसम गर्म और आंशिक रूप से बादल छाए रहे, कुछ दिनों हल्की बारिश भी हुई। आने वाले सप्ताह में 5-15 मिमी तक बहुत हल्की से हल्की वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 31.0-34.0 डिग्री सेल्सियस और 25.0-26.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा पूर्व-दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व-पूर्व और दक्षिण-पूर्व-दक्षिण दिशाओं से 5-10 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। 8 से 11 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ-साथ आंधी-तूफान आने की आशंका को लेकर पीली चेतावनी जारी की गई है, जबकि 7 अगस्त के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम जानकारी, वर्षा संबंधी अलर्ट और फसल संबंधी सलाह सेवाओं के लिए "मौसम" और "मेघदूत" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिजली गिरने के आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए "दामिनी" ऐप भी उपलब्ध है। मेघदूत और मौसम ऐप अब क्राउडसोर्सिंग का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे आईएमडी को किसानों से डेटा एकत्र करने और पूर्वानुमान को मजबूत करने तथा कृषि कार्यों में इसके अनुप्रयोग को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सभी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि के पूर्वानुमान में 07.08.2026 से 13.08.2026 के दौरान कम वर्षा और सामान्य अधिकतम और न्यूनतम तापमान का रुझान दिखाया गया है। एनडीवीआई मान जिले में मध्यम से अच्छी कृषि क्षमता को दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के अनुसार, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है ताकि अनुकूलतम नमी की स्थिति के साथ नियमित कृषि गतिविधियों को निर्धारित किया जा सके।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण 20-40 दिनों के अंतराल पर किया जा सकता है। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए प्री-इमर्जेंस हर्बिसाइड जैसे कि प्रीटिलाक्लोर 50% ईसी 1.2-1.5 लीटर/हेक्टेयर, ब्यूटाक्लोर 50% ईसी 3.0 लीटर/हेक्टेयर, और पेंडिमेथालिन 30% ईसी 1-1.5 लीटर/हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जा सकता है। प्री-इमर्जेंस हर्बिसाइड अच्छा प्रयोग है, जिसके लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए खेत में कम गहराई तक पानी बनाए रखना आवश्यक है। तना छेदक कीटों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए क्लोरेट्रानिलिप्रोले 18.5% एससी का उपयोग किया जा सकता है। रसायन का प्रयोग सुबह और शाम के समय करना चाहिए।
गन्ना	मिट्टी चढ़ाने और बांधने का काम पूरा करने के बाद, यदि आवश्यक हो तो मिट्टी की नमी के आधार पर सिंचाई करें।
मक्का	मक्का की फसल में निराई-गुड़ाई का कार्य 20 और 35 दिनों के अंतराल पर किया जाना चाहिए। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर सुबह या शाम के समय यूरिया का छिड़काव करना चाहिए।
मूँग	जब फसल में पर्याप्त नमी हो और खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बन रही हों, तभी निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर शेष खरीफ मूँग की बुवाई शुरू कर देनी चाहिए।
काला चना	जब फसल में पर्याप्त मिट्टी की नमी हो, तभी निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर शेष उड़द की बुवाई शुरू कर देनी चाहिए।
मूँगफली	मूँगफली में खरपतवार नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए और रासायनिक उर्वरक का छिड़काव सुबह या शाम के समय किया जाना चाहिए। तीन सप्ताह पुरानी फसल में जिप्सम की शेष मात्रा और बोरेक्स की पूरी मात्रा का छिड़काव तब किया जाना चाहिए जब मिट्टी में नमी का स्तर अनुकूल हो।
तिल	फसल में पर्याप्त नमी होने पर यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है और खरपतवार नियंत्रण के उपाय भी किए जाने चाहिए। प्रभावी परिणामों के लिए सभी छिड़काव सुबह या शाम के समय किए जा सकते हैं। शेष तिल की फसल की बुवाई मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर की जा सकती है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	बारिश के बाद रोग लगने की संभावना रहती है, इसलिए संक्रमित पौधों को नष्ट कर दें (जब पत्तियाँ मुरझाई हुई और धब्बेदार दिखाई देने लगे)। वायरल रोगों और रस चूसने वाले कीटों के खिलाफ रासायनिक छिड़काव सुबह या शाम के समय करें। पके टमाटरों को तोड़कर बिक्री के लिए भेज दें या उन्हें सुरक्षित रूप से भंडारित कर लें।
कद्दू	कद्दू की फसल पर अनियमित आकार के पीले धब्बे दिखाई देने पर, पत्तियों को पलटकर जांच करें। यदि पत्तियों के निचले हिस्से में हल्के भूरे रंग की फफूंद दिखाई दे, तो उसका रासायनिक उपचार करें। आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई करें और रासायनिक छिड़काव सुबह और शाम के समय करें।

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
लौकी	लौकी की फसल पर अनियमित आकार के पीले धब्बे दिखाई देने पर, पत्तियों को पलटकर जांच करें। यदि पत्तियों के निचले हिस्से में हल्के भूरे रंग की फफूंद दिखाई दे, तो उसका रासायनिक उपचार करें। आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई करें और रासायनिक छिड़काव सुबह और शाम के समय करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	जुलाई प्रसव का महीना है, इसलिए ब्याने के समय पशु की लगातार निगरानी करनी चाहिए और ब्याने के बाद उसकी अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। गर्भाशय की सफाई के लिए तीन दिनों तक सुबह और शाम 200 मिलीलीटर यूट्रोटेन/हरिरा/जिनटोन नामक किसी भी दवा का सेवन कराएं। बरसात के मौसम में पशुशाला की नियमित रूप से 2-3 बार सफाई करनी चाहिए। नमी के कारण होने वाले 'फुटरोट' रोग से बचाव के लिए, कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए खुरों को 10% फॉर्मेलिन घोल या 5% नीले घोल में डुबोकर रखना चाहिए। नवजात बछड़ों जैसे छोटे जुगाली करने वाले पशुओं को बरसात के दिनों में गीला होने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी/खांसी/निमोनिया न हो।
गाय	जुलाई प्रसव का महीना है, इसलिए ब्याने के समय पशु की लगातार निगरानी करनी चाहिए और ब्याने के बाद उसकी अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। गर्भाशय की सफाई के लिए तीन दिनों तक सुबह और शाम 200 मिलीलीटर यूट्रोटेन/हरिरा/जिनटोन नामक किसी भी दवा का सेवन कराएं। बरसात के मौसम में पशुशाला की नियमित रूप से 2-3 बार सफाई करनी चाहिए। नमी के कारण होने वाले 'फुटरोट' रोग से बचाव के लिए, कम से कम 3 दिनों तक सुबह और शाम 2-3 मिनट के लिए खुरों को 10% फॉर्मेलिन घोल या 5% नीले घोल में डुबोकर रखना चाहिए। नवजात बछड़ों जैसे छोटे जुगाली करने वाले पशुओं को बरसात के दिनों में गीला होने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी/खांसी/निमोनिया न हो।
भेड़	भेड़ जैसे छोटे जुगाली करने वाले जानवरों को बरसात के दिनों में भीगने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी/खांसी/निमोनिया न हो जाए।
बकरा	बकरियों जैसे छोटे जुगाली करने वाले जानवरों को बरसात के दिनों में भीगने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी/खांसी/निमोनिया न हो जाए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन आंधी और बिजली गिरने से खुले में मौजूद मनुष्यों और जानवरों को नुकसान हो सकता है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

आंधी और बिजली गिरने की स्थिति में लोगों को खुद को और अपने जानवरों को छाया में रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की क्षति से बचा जा सके।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details