



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-03-2026

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-03-30 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-03-31	2026-04-01	2026-04-02	2026-04-03	2026-04-04
वर्षा (मिमी)	1.0	0.2	0.3	0.0	1.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	34.0	35.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	16.0	16.0	15.0	17.0	17.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	58	54	49	39	44
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	19	14	15	11	19
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	8	8	11	9
पवन दिशा (डिग्री)	31	320	270	300	340
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	2	2	5
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

पिछले सप्ताह (23 से 29 मार्च) कोई वर्षा दर्ज नहीं की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 27.0 से 32.8 डिग्री सेल्सियस और 12.8 से 16.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 79-89% और 30-40% के बीच रही। हवा पश्चिम और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से 2.6-5.8 किमी प्रति घंटे की गति से चली। पिछले सप्ताह आसमान में बदल रहे तथा मौसम भी हवादार रहा। आगामी सप्ताह में 1 मिमी की हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिसमें अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 33.0-36.0 डिग्री सेल्सियस और 15.0-17.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम-पश्चिम और उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा से 4-11 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। कोई महत्वपूर्ण चेतावनी जारी नहीं की गई है और क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी जारी नहीं की गई।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई प्रभाव नहीं।

### सामान्य सलाहकार:

मौसम का पूर्वानुमान "मौसम ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और मौसम संबंधी कृषि-सलाह "मेघदूत ऐप" पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। बिजली गिरने की जानकारी के लिए "दामिनी ऐप" उपलब्ध है। मौसम, मेघदूत और दामिनी ऐप गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 27 मार्च से 2 अप्रैल तक के विस्तारित पूर्वानुमान में सामान्य से अधिक वर्षा और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का संकेत दिया गया है।

### लघु संदेश सलाहकार:

कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए आवश्यकतानुसार सिंचाई और रसायनिक प्रयोग किया जा सकता है।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चना	फ़सल में सिंचाई के साथ-साथ कीटनाशक या रोग नियंत्रण रसायन जैसे कि इंडोक्साकार्ब, इमेमेक्टिन बेन्जोएट और क्लोरेंट्रानिलिप्रोले की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए।
मसूर की दाल	The irrigation and recommended doses of insecticide or disease control chemical i.e. Indoxacarb, Emamectin benzoate and Chlorantraniliprole should be applied in the crop.
सरसों	पकी हुई फसल को कटाई के बाद अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए और थ्रेसिंग से पहले उचित सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। कटाई के बाद फलियों को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारित करना चाहिए।
गेहूँ	फलारिस माइनर और जंगली जई जैसे खरपतवारों को खरपतवारनाशकों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाना चाहिए, साथ ही उपज के नुकसान को रोकने के लिए पीले और भूरे रतुआ को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए।
गन्ना	वसंत ऋतु में बोई गई गन्ने की फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई और नियमित निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। शरद ऋतु में बोई गई गन्ने की फसल और नई गन्ने की फसल में सिंचाई के बाद यूरिया की टॉप-ड्रेसिंग करनी चाहिए।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	फल लगने के बाद आम के हॉपर के प्रकोप की स्थिति में, आम के बाग में 3 मिली/10 लीटर की दर से इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव किया जाना चाहिए।
टमाटर	टमाटर की फसल में, रोपण से पहले जड़ों को 1 ग्राम/लीटर पानी में इमिडाक्लोप्रिड में 10-15 मिनट के लिए डुबोना चाहिए। जल्दी रोपित फसलों में सिकुड़ी हुई चितकबरी पत्तियों के लक्षण दिखने पर, संक्रमित पौधों को हटा देना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए।
बैंगन	बोई गई फसल में आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई और सिंचाई की जानी चाहिए।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गर्भवती पशुओं में प्रसवोत्तर ज्वर से बचाव के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें प्रतिदिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान वे बांझपन और जॉन रोग (पैराट्यूबरकुलोसिस) के प्रति संवेदनशील होते हैं। वयस्क पशुओं में, फुट एंड माउथ रोग के टीकाकरण से 15 दिन पहले कृमिनाशक दवा का प्रयोग करना आवश्यक है।
गाय	गर्भवती पशुओं में प्रसवोत्तर ज्वर से बचाव के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें प्रतिदिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान वे बांझपन और जॉन रोग (पैराट्यूबरकुलोसिस) के प्रति संवेदनशील होते हैं। वयस्क पशुओं में, फुट एंड माउथ रोग के टीकाकरण से 15 दिन पहले कृमिनाशक दवा का प्रयोग करना आवश्यक है।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई प्रभाव नहीं।

**प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):**

कोई सलाह नहीं ।

Farmers are advised to download Unified **Mausam** and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

**Mausam MobileApp link:** <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link:** <https://play.google.com/store/apps/details>

**Damini MobileApp link :** <https://play.google.com/store/apps/details>